

Herrero, J. et al. (1964) Cartografía de Frutales de Hueso y Pepita. Capítulo IV: Apéndice de variedades: PERAL

Mostillera

Tamaño: Pequeño o mediano.

Forma: Turbinada breve. Cuello muy ligero. Asimétrica. Contorno irregularmente redondeado.

Cavidad del pedúnculo: Estrecha, poco profunda, mamelonada. **Pedúnculo:** Corto o medio. Fuerte, leñoso, engrosado en ambos extremos. Ruginoso, de color castaño rojizo. Recto. Implantado generalmente oblicuo.

Cavidad del ojo: Anchura y profundidad medias. Borde fuertemente ondulado. **Ojo:** Mediano o pequeño. Semi-cerrado o abierto. Sépalos negruzcos, rizados, de posición variable o rotos quedando solo la base.

Piel: Lisa, fina, brillante. **Color:** Amarillo verdoso o amarillo pálido. Chapa de color sonrosado pálido que puede llegar a cubrir algo más de medio fruto. Punteado muy menudo, ruginoso cobrizo. Pequeñas zonas ruginosas en la base del pedúnculo y alrededor del ojo.

Tubo del cáliz: En embudo con conducto corto y ancho. Base de los pistilos carnosa, llenando el conducto.

Corazón: Mal delimitado, no se puede precisar tamaño ni forma. Eje de forma muy irregular, lanoso, abierto en parte. Celdillas muy amplias, muy próximas al ojo. Parte de las celdillas deprimidas y nulas.

Semillas: Grandes, semi-globosas, aplastadas en la cara interna. Color castaño rojizo claro con partes más oscuras. Muy escasas.

Maduración: Invierno

